


هـوـا السـلـام





صنعت پریز فضای سبز

معرفی فضای سبز پتروشیمی فجر

گردآوری و تدوین
روابط عمومی شرکت پتروشیمی فجر
بهار و تابستان ۱۳۹۴




درختان و درختچه ها صفحه ۱۶

گیاهان فصلی صفحه ۳۲

گیاهان آپارتمانی صفحه ۴۴

واژه نامه صفحه ۵۹









امروزه اهمیت فضای سبز و محیط زیست روز به روز نمود بیشتری پیدا می کند. توجه به درختکاری و ایجاد فضای سبز به عنوان یک "ضرورت" قلمداد می شود. به خصوص که در کشور ما _ به عنوان یک کشور کم بارش - این ضرورت نمایان تر است.

اکنون با توجه به صنعتی شدن جامعه ما، لزوم بازنگری در افکارمان نسبت به محیط زیستی که برای آینده‌گان به جای می گذاریم؛ بیش از پیش حس می گردد. ایجاد فضای سبز علاوه بر تصفیه و پالایش محیط زیست، روحیه و شادابی فراوانی به انسان ها هدیه می دهد. به طوریکه تاثیر حتی یک گیاه بر چرخه زندگی و حیات ما قابل توجه است.

در تعالیم دینی ما هم به کاشت درخت سفارش اکید شده است. در برخی روایت ها به "صدقه جاریه" تعبیر شده است.


اما در شرکت پتروشیمی فجر و تاکید سازمان بر رعایت مسئولیت اجتماعی، تاکنون ۴۰۰۰۰ متر مربع فضای سبز کیفی و متنوع ایجاد شده است. جای دارد که از همکاران بخش فضای سبز شرکت و در راس آنها رییس محترم خدمات اداری که با درایت، حوصله، تخصص و تعهد خود گونه های بسیار متنوعی در این شرایط سخت آب و هوایی ایجاد کرده اند، تقدیر به عمل آید.

بیش از ۶۲ گونه گیاه بومی و غیر بومی با حسن سلیقه، تصویر زیبایی از جمال طبیعت را به مانشان می دهند. برای کسب تجارت این عزیزان در توسعه فضای سبز مناطق نمک زار، مرطوب و گرم امکان استفاده مطلوب با برقرار کردن ارتباط با افراد یاد شده برای همه علاقمندان و مسئولین فضای سبز وجود دارد.

به منظور شناساندن و معرفی این فضای سبز و تهیه شناسنامه ای از تنوع گیاهان کاشته شده در نواحی پتروشیمی فجر، این کتابچه در روابط عمومی پتروشیمی فجر تهیه، تدوین و منتشر گردیده و در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.



علیرضا شمیم
مدیرعامل








مساحت کل فضای سبز شرکت پتروشیمی فجر تا کنون ۴۰۰۰۰ متر مربع می باشد. این مساحت شامل درختکاری و گل کاری در ناحیه ۱ و ناحیه ۲ و واحد های تصفیه پساب می باشد. سالانه به مساحت فضای سبز شرکت افزوده می شود؛ پیش بینی می شود در سال جاری (۱۳۹۴) حدود ۵۰۰ مترمربع به سطح یاد شده اضافه شود.

به لحاظ تنوع گیاهی بیش از ۳۲ نمونه درخت و درختچه، ۲۰ نمونه گیاه فصلی و ۱۰ نمونه گیاه آپارتمانی، گوناگونی پوشش گیاهی شرکت فجر را تشکیل داده است. علت انتخاب این گونه های گیاهی در شرکت فجر در مرحله اول سازگاری با آب و هوای گرم و مرطوب و زمین شوره زار منطقه و در مرحله دوم تناسب با معماری محیطی و طراحی فضای سبز شرکت می باشد.





10



فصل نخست

در حدان و در حجه
پ



زیتون

زیتون از شاخه گیاهان گل دار، از گیاهان جدا گلبرگ و از تیره زیتونیان است. زیتون گیاهی است همیشه سبز با عمر زیاد که می‌توان به مفهومی آن را درخت ابدی دانست و در صورتی که تنہ اصلی این درخت از بین بروز زندگی مجددش را با رویش پاجوش‌ها ادامه می‌دهد. زیتون با اقلیم‌های مدیترانه‌ای و شبیه مدیترانه‌ای سازگار است. زیتون در مناطقی بهترین عملکرد را خواهد داشت که دارای زمستان‌هایی معتدل و تابستان‌هایی گرم و خشک و طولانی باشند. درخت زیتون از خاک‌های سنگین هوموس دار، آبدار و اراضی اسیدی، خاک عمیق رسی - شنی، قابل نفوذ و آهک دار و دارای سطح ایستایی^{*} بالای آب که حالت غرقابی ایجاد می‌نماید گریزان است و نسبت به شوری خاک مقاومت نسبی دارد. بهترین خاک برای کشت زیتون، خاک‌های لوسمی^{*} و روسوبی کنار رودخانه‌ها و اراضی دارای زهکشی خوب می‌باشد. از دیاد درخت زیتون از راه‌های مختلف صورت می‌گیرد مانند کاشت هسته، قلمه، خوابانیدن شاخه و پیوند بذری است.



انجیر

درخت انجیر که نام لاتین آن فیکوس (Ficus) می‌باشد از خانواده (Moracee) موراسه است و دارای ۶۰۰ گونه می‌باشد که اغلب انواع آن وحشی یا زینتی هستند مانند درخت معروف به درخت کاتچو (فیکوس الاستیکا) که هم زینتی است و هم صنعتی فیکوس بنگالنسیس و فیکوس رلیگیوزا انواع زینتی این گیاه می‌باشند که در تزیینات و به عنوان گیاه آپارتمانی مصرف زیاد دارند. انواعی که در باغبانی برای تولید میوه آن مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از فیکوس کاریکا، فیکوس پالماتا و فیکوس پودوکاریکا. فیکوس کاریکا همان انجیر معمولی است که به عنوان میوه مورد استفاده قرار می‌گیرد. ولی فیکوس پالماتا و فیکوس پودوکاریکا بیشتر برای تلقیح انواع انجیر خوارکی کاشته می‌شوند. انجیر با توجه به ارزش غذایی و طبی بالا در بیشتر نقاط دنیا از جمله گرمسیری نیمه گرمسیری و معتدل کاشت می‌شود. استان فارس و شهرستان استهبان^{*} سهم عمده‌ای در تولید انجیر خشک در ایران و دنیا دارند.

انجیر معابد



انجیر معابد (نام علمی: *Ficus religiosa*) یکی از بلندترین درختان جنگل‌های بارانی است و چرخه زندگی غیر معمولی دارد. دانه‌های آن در درون فصله پرنده‌گان بر روی درختان دیگر سقوط می‌کند. این دانه‌ها گوانه می‌آورند که ریشه‌هایش را به پایین به سمت زمین می‌فرستد. شاخه‌های گیاه تنه درخت میزبان را در برگرفته به تدریج آن را خفه می‌کنند. سپس درخت انجیر معابد بر روی پای خود می‌ایستد. این درخت در مناطق گرمسیری ایران هم رشد می‌کند و هم اکنون جزو پوشش گیاهی جزایر خلیج فارس است.

نام گذاری این درخت به عنوان انجیر معابد به زمان بودا بر می‌گردد و دلیل آن وجود درخت انجیر مقدسی که بنا به اعتقاد بوداییان، سیدارتا گواتاما (مشهور به بودا) در زیر آن به مراقبۀ پرداخت و به روشن بینی رسید. در نماد شناسی مذهبی این درختان مقدس از روی برگ‌های قلبی شکل خود مورد مورد شناسایی قرار می‌گیرند. مشهورترین این درختان، درخت انجیر مقدسی در معبد ماها بودیاست که زمان کاشت آن به سال ۲۸۸ قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد و مستقیماً از درخت اصلی نشازده شده است.^{*}

سه پستان

سه پستان درختی است که ارتفاع آن تا ۱۲ متر می‌رسد. اندام هوایی گیاه، به جز برگ‌ها، پوشیده از کرک‌های خشن است. برگ‌ها دارای دمبرگ دراز و اکثراً بیضی شکل هستند که گاه به نوک نازکی ختم می‌شوند و به صورت متناسب بر روی شاخه قرار می‌گیرند. گل‌ها قیفی شکل، سفید رنگ و یا مایل به کرم می‌باشند که به صورت مجتمع گرزن با فاصله روى محوري قرار می‌گيرند. میوه‌ها به صورت شفت بوده و پس از رسیدن کامل کروی شکل به اندازه گیلاس و به رنگ زرد می‌شوند، اما وقتی به طول کامل می‌رسند رنگ آنها به سیاهی می‌گراید. این میوه‌ها مزه‌ای شیرین و طعمی موسیل‌ازی دارند و حاوی یک یا دو دانه هستند. این گیاه از شرق مدیترانه تا شرق هندوستان به طور بومی گسترش دارد.^{*}

سه پستان چون موسیل‌از قابل توجهی دارد، از قدیم با تخم مردو، به دانه و بارهنگ^{*} که آنها نیز دارای موسیل‌از می‌باشند، به نام چهار تخمه به عنوان ضد سرفه و برای نرم کردن سینه مصرف می‌شود.





نخل بادبزنی

نخل (پالم) بادبزنی از خانواده نخل ها است که برگ های پنجه ای و بزرگ دارد. برگچه ها در بخش تحتانی متصل به یکدیگرند. برگ ها غالباً رشد عمودی دارند و رشته های تار مانند و سفیدی به صورت کرک در اطراف برگ نمایان می شوند. این نخل نسبت به سایر نخل های گرمسیری به سرمای ملایم نزدیک به صفر درجه و گاهی منفی پنج درجه، مقاومت دارد. این نخل را می توان به راحتی در فضای پر نور داخل و گلخانه های نیمه گرم نگهداری کرد.

علاوه بر کاشت بذر، اغلب موقع این گیاه پاجوش تولید می کند که راحت ترین روش تکثیر جدا کردن پاجوش هاست. خاک مورد نیاز آن یک قسمت خاک برگ و یک قسمت تورب^{*} (یکی از انواع بیت^{*}) و ماسه و خاک باعچه است به طور مرتب و نه چندان زیاد به آبیاری نیاز دارد. بسته به دمای محیط نباید اجازه داد گلダン خیلی خشک شود.



نخل خرما

سابقه کشت این درخت در دنیا به بیش از ۵۰۰۰ سال پیش می رسد. تکثیر این درخت بوسیله هسته خرما یا به وسیله جابه جا کردن پاجوش^{*} ها (جوانه های خرما) صورت می گیرد. بهترین وسیله تکثیر خرما همان جابه جا کردن درخت کوچکی است که اطراف درخت نخل مادر تولید می شود. بهترین فصل تکثیر، تابستان و ماه های تیر و مرداد است. طریقه باروری این درخت به این صورت است که به ازاء هر ۹۵ نفر درخت ماده (واحد شمارش نخل خرما نفر می باشد) ۱۵ نفر درخت نر در نظر گرفته می شود و خوش ها را از درخت نر درمی آورند و درختان ماده را بارور می کنند که در اصطلاح محلی به این عمل ایوار می گویند. این درخت دارای انواع مختلف می باشد .

نخل فونیکس

نام انگلیسی: Canary Island Date Palm

منشاء: جزایر قناری*

خاک مناسب برای این نخل، مخلوط خاک با چه به همراه خاک برگ و زهکشی مناسب و نیازمند به مکان نیم سایه تا آفتابی است، برای تغذیه هر ۲ هفته یک باز نیاز به کود کامل دارد. ارتفاع آن به ۲ متر می رسد.

روش تکثیر این گیاه با تقسیم پاچوش، کاشت بذر تکثیر می شود، پاچوش ها را می توان در اواخر بهار جدا نمود و در گلدان های جداگانه کاشت. بذر ها را نیز می توان در اوایل بهار کشت نمود و تقریباً ۲ ماه بعد شاهد سبز شدن آنها بود.

شاخ و برگ بخش زینتی این گیاه را تشکیل می دهند و گل های این گیاه جنبه زینتی ندارد.

نخل فونیکس دارای رشد کندی است و باید مراقب بود تا به تنہ می آنسیبی نرسد زیرا باعث نابودی گیاه می گردد و همچنین در هنگام رسیدگی مراقب برگ های نوک تیز آن باشد.

توت

درخت توت بومی چین است و در نقاط استیپی و شمال ایران کشت می شود و حتی به طور خودرو در جنگل های شمال ایران پراکنده شده است. توت درختی است که ارتفاع آن به ۲۰ متر و قطرش به یک متر می رسد دارای تنہ راست و عمود و پوستی شیاردار، خاکستری مایل به زرد است. برگ هایش مختلف الشکل، صاف و لوب دار یا دندانه دار، با قاعده نیم قلبی و انتهای تیز است. رنگ آن سبز روشن و برآق است و دمبرگ آن بلند می باشد. میوه توت، مرکب، استوانه ای یا بیضی شکل کشیده است. میوه آن کم و بیش بلند و رنگ آن سفید تا شکری و غفائی* و حتی جگری تیره دیده می شود و به واسطه رنگ میوه و یا دارا بودن دانه و یا بی دانه بودن آن و یا به علت آویزان بودن شاخه ها به واریته های مختلفی تقسیم می شود. برگ توت در بهار برای تربیت کرم ابریشم و در پاییز به مصرف علوفه دام می رسد.





لیمو شیرازی

لیموی شیرازی به لیمو شیشه، لیمو جهرمی و یا لیموی عمانی معروف است. این لیمو با لیمو اورکا و لیسبون کاملاً متفاوت است، درختی است بسیار پر محصول که سالی یک بار محصول می دهد.

این میوه در درمان عفونت ها، تب ها، سرماخوردگی، گلودرد، التهاب لثه و به عنوان تقویت کننده کبد و لوزالمعده استفاده می شود. آب لیمو بزاق را زیاد می کند و چون بزاق دارای اثر ضد عفونی کننده‌گی است میکروب های دهان را از بین می برد.

تخم یا دانه‌ی لیموترش اثر ضد تب، ضد سم و ضد کرم دارد. برای هر یک از این موارد باید تخم (دانه) لیموترش را گرفته، ابتدا پوست سفیدی که در خارج آن است را جدا کرد سپس بحسب سن و وزن بیمار به مقدار ۴ تا ۸ گرم از مغز تخم لیمو با مقداری آب گرم تناول کرد.

شکوفه لیمو (بهار) دارای عطر و بوی بسیار خوبی است و از آن مریبا و دم نوشته می کنند.


دارابی

دارابی یا پومیلو میوه‌ی بومی آسیای جنوب شرقی و از خانواده‌ی مركبات است. پومیلو بزرگترین میوه خانواده مركبات است. رنگ آن سبز کم رنگ و گاهی هم زرد با گوشت سفید است و به ندرت صورتی و قرمز است. پوست آن بسیار ضخیم و شیرین است. نوع بومی شرق آسیا حدود ۱۵-۲۵ کیلوگرم می رسد. سانتی متر قطر دارد و وزن آن به ۱ تا ۲ کیلوگرم می رسد. گریپ فروت نیز احتمالاً از پیوند پرتقال و دارابی به دست آمده است. همچنین در برخی متون تاریخی و قدیمی انگلیسی زبان، نام گریپ فروت برای نامیدن پومیلو (دارابی) استفاده شده است.

از هسته دارابی، ماده‌ای که با عنوان عصاره هسته مركبات نیز شناخته می شود تهیه می گردد که برخی از پزشکان طب جایگزین اظهار داشته‌اند این عصاره دارای خواص ضد باکتری، ضد ویروسی و ضد قارچ می باشد.

نارنج

نارنج (نام علمی: *Citrus aurantium*) نام درخت و میوه‌ای از جنس مرکبات است. نارنج در ایران به فراوانی تولید می‌شود و محصولات جانبی متعددی نیز دارد. درختی بزرگ و زیباست با برگ‌هایی بزرگ تر و خوشبوتر از برگ‌های درخت لیمو. شکوفه‌های آن که بسیار خوشبو است بهار نارنج نامیده می‌شود. در بعضی مناطق در تمام فصول سال می‌توان میوه نارنج را بر روی درخت دید، در حالی که هنوز میوه سال گذشته بر درخت است و میوه‌های جدید هم در حال رسیدن هستند. شکوفه نارنج طبیعت گرم و خشک دارد، بیوین آن شادی آور، تقویت کننده مغز و از بین برنده آبریزش بینی (زکام) است. از این شکوفه‌ها مربای لذیذی تهیه می‌شود. اگر یک قاشق مریاخوری از گل شکوفه خشک نارنج را به یک فنجان آب جوش اضافه کنید و در فنجان را بیندید بعدها د دقیقه نوشیدنی بسیار خوشبو و نشاط آوری آمده می‌شود.



کامکوات

کامکوات میوه‌ای از خانواده مرکبات است و شبیه پرتقال، پوست نارنجی رنگ دارد، درون آن مانند سایر مرکبات پره‌پره است، ولی اندازه و شکل آن مانند خرما است. این میوه معمولاً با پوست خورده می‌شود و از آن مربا نیز تهیه می‌گردد. درخت کامکوات دارای برگ‌های ریز و همیشه سبز است و بومی بخشی از کوه‌های جنوب شرق چین است و در حال حاضر به منظور بهره‌برداری از میوه لذیذ آن و همچنین به عنوان یک گیاه تزیینی در نقاط دیگر دنیا کشت و پرورش داده می‌شود. در فصل زمستان یک درخت بالغ کامکوات می‌تواند وزن چند صد عدد از میوه‌های زیبایش را که هر کدام به اندازه یک زیتون درشت هستند را تحمل کند. کامکوات‌هایی که در باغ یا باعچه کاشته می‌شوند (نه در گلستان)، می‌توانند تا ارتفاع ۲,۵ متر و عرض ۱۸۰ سانتی‌متر رشد کنند.





شاه پسند

شاه پسند درختچه‌ای کوچک و گلداری است که در مناطق سردسیر و همای زمستانی باید در گلخانه نگهداری شود. در دمای حدود صفر از بین می‌رود. در مناطق گرمسیر در هوای آزاد کشت شده و به عنوان گیاه فضای سبز نیز استفاده می‌شود. برگ‌های آن متقابل و دائمی است و در نتیجه خرد شدن برگ‌ها بوی نسبتاً زننده‌ای تولید می‌کند. گل‌ها خوش‌های و به رنگ زرد و قرمزند و میوه آن به صورت حبه‌های آبی تا سیاه دیده می‌شوند.

شاه پسند گیاهی با عادت رشد درختچه‌ای بوده و متعلق به تیره‌ی شاه پسند است. گفته شده که در صورت داشتن قیم می‌تواند حتی تا ارتفاع ۱۵ متری رشد کند، ولی چنین ارتفاعی در ایران مشاهده نشده است، ارتفاعی که معمولاً دیده می‌شود ۱ تا ۳ متر است.

این گونه به شدت متنوع، پیچیده و کمپلکس است، به طوری که حدود ۶۰۰ رقم زینتی، وحشی و دورگه از آن وجود دارد. تکثیر درختچه شاه پسند به وسیله‌ی بذر قلمه و خوابانیدن^{*} صورت می‌گیرد.

خرزهره

نام‌های فارسی: خرزهره، جاروجور، گیش، کیش، ژاله، شبرنگ خرزهره گیاهی است چند ساله که به صورت بوته‌ای و یا درختچه می‌روید. این گیاه که بومی مناطق مدیترانه‌ای است، به عنوان گیاه زینتی در بسیاری از نقاط دنیا کاشته می‌شود. خرزهره در تمام طول سال سبز بوده و دارای رشد سریعی است به طوری که معمولاً در طول سال نیاز به یه بار هرس شدن دارد.

برگ‌های آن سبز تیره با قوامی چرمی و رگبرگ‌های واضح، باریک، نیزه‌ای کشیده به طول ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر هستند. گل‌ها به رنگ‌های متنوع و در فصول گرم ظاهر می‌شوند. رنگ گل‌ها سفید، صورتی، قرمز و رنگ‌های حد واسط است. میوه‌ی گیاه باریک و قلمی است و پوشش غلاف مانند آن حاوی تعداد زیادی دانه با موهای ابریشمی است. این گیاه در بسیاری از مناطق ایران کاشته می‌شود و در برخی نواحی نیز به صورت خودرو یافت می‌شود.

ختمی چینی

گلی مورد توجه عامه، از خانواده‌ی «پنیرکیان»، گل‌ها درشت و قرمز و عمر آنها کوتاه است ولی با فراوانی و طول مدت باز شدن خود تلافی می‌نمایند.

مانند کلیه گیاهان خانواده‌پنیرکیان پرچم‌ها تولید لوله‌ای نموده است که مادگی از وسط آن‌ها عبور می‌نماید، مادگی دراز و از جام گل بیرون زده و کاملاً آشکار است، دوران گلدهی از اواسط بهار تا اواسط پاییز است. برگ‌ها سبز برآق و به صورت متناوب روی شاخه‌ها می‌رویند. در چین از گل‌های قرمز آن رنگ می‌سازند.

به نور کافی و فراوان احتیاج دارد ولی اشعه‌ی مستقیم آفتاب در ظهر تابستان به برگ‌ها و گل‌ها صدمه وارد می‌کند. جهت مرطوب نگه داشتن خاک به هفته‌ای سه بار آبیاری در تابستان نیاز دارد، هرگز اجازه ندهید آب اضافی در گلدان بماند حتماً زهکش^{*} را بازدید کنید، در زمستان هنگامی آبیاری کنید که سطح خاک کاملاً خشک شده باشد.



آکاسیا برگ بیدی

آکاسیای برگ بیدی، درختچه‌ای بزرگ و یا درختی کوچک، همیشه سبز بوده و ارتفاع آن بسته به شرایط محیطی ۵ تا ۱۲ متر است. شاخ و برگ‌های نوسانی این درخت که به صورت آویخته هستند، حالتی مشابه با درخت بید دارند، به همین دلیل در زبان فارسی آکاسیای برگ بیدی نامیده می‌شود. درختی با رشد سریع بوده و می‌تواند به کمک باکتری‌ها نیتروژن خاک را تثبیت کند. تسبباً به خشکی مقاوم است. آکاسیای برگ بیدی از مقاوم ترین آکاسیاهای به شرایط شور است، اغلب برای تهییه‌ی سایه و نیز به عنوان درختی زینتی از آن استفاده می‌شود. این درخت در درجه اول به منظور تثبیت شن‌های روان و به عنوان بادشکن یا به خاطر سازگاری خوب آن کاشته می‌شود.

این گونه به دلیل برگ‌های زیبا، باریک و کشیده و تاج پوشش زیبا، شاخه‌های باریک، آویزان و مجنونش درخت بسیار مناسبی کاشت در پارک‌های کوچک و محله‌ای، وسط بلوار و نیز به عنوان تک درخت در وسط چمن می‌باشد.



انگور

انگور یکی از میوه هایی است که از زمان های بسیار قدیم مورد استفاده قرار می گرفته است. عده ای معتقدند که حتی پیش از پیدایش غلات مورد استفاده بشر قرار گرفته است.

انگور درختچه ای بالارونده است که به کمک پیچک های خود به سهولت از موانع و درختان مجاور بالا می رود و درازای آن به ۱۰ تا ۱۵ متر می رسد ساقه آن گره دار است. گل های کوچک و مجتمع به صورت خوشة مرکب دارد. میوه آن ^{*}سته و گوشتلدار است و پس از رسیدن دارای طعم شیرین ملایم و رنگ های متفاوت به تناسب نژادهای مختلف می گردد.

نیاز به آب و هوای گرم و معتدل دارد، سیستم ریشه ای عمیق دارد و نیازش به آب متوسط است. به خشکی مقاومت دارد مخصوصاً اگر در خاک های عمیق استقرار یابد، به رطوبت مقاومت پایینی دارد و نسبت به باد اگر روی دارست باشد مقاومت متوسط تا خوبی دارد. گرده افشاری آن با باد انجام می شود و نیازی به حشرات نیست. شرایط گرم و خشک، گرده افشاری و میوه دهی را بهبود می بخشد.

انار

انار درخت کوچکی است که ارتفاع آن حداقل تا ۶ متر می رسد و در مناطق نیمه گرمسیری می روید. گل های انار درشت و به رنگ قرمز اناری و بی بو می باشند. میوه آن کروی با اندازه های مختلف، دارای پوستی قرمز رنگ و با زرد رنگ است. رویه هم رفته در حدود بیست نوع مختلف انار که شامل واریته های بسیار متنوعی می باشد در دنیا موجود است. انار از گیاهان بومی ایران به شمار می آید، و امروزه به صورت وحشی در کلیه سواحل دریای شمال و نقاط استپی معتدل نظیر جنگل های غرب در لرستان، کردستان، بختیاری و فارس می روید. ایرانیان از حدود سه هزار سال پیش با کشت انار آشنا شده اند و با کشت مداوم آن در نقاط مختلف و مساعد آن را به صورت اهلی درآورده و با سلکسیون های متعدد موفق به کشت ارقام پر محصول و مرغوب تجاری در کلیه مناطق از جمله در نواحی حاشیه کویر مرکزی ایران شده اند. به گونه ای که هم اکنون شهرهای مستقر در این مناطق از عملده ترین مراکز استقرار باغ های انار هستند.

کنار (سدر)

سردهای از درختان و درختچه‌های تیغ‌دار از تیره عنابیان است. حدود ۴۰ گونه کنار وجود دارد که در مناطق گرمسیری و زیرگرمسیری پراکنده‌گی دارند. نام این درخت به عربی سدر است و در ایران معمولاً برگ‌های کوبیده آن را «سدر» می‌نامند. میوه این درخت نیز کنار نامیده می‌شود و خوردنی است.

کنار درختی است به ارتفاع نزدیک به ۱۰ متر با برگ‌های کوچک و قلی شکل و کشیده با سه رگبرگ برجسته که گوشوارک آن به خار تبدیل شده است. میوه کنار خوارکی است. کنار میوه مغذی و سرشار از ویتامین C و مقادیر نسبتاً خوبی از ویتامین E و محتوی کلسیم، فسفر و آهن است برایحتی هضم و اثر ملین آور دارد و گوشت آن شیرین و خوشمزه است.

درخت کنار مقاوم ترین درخت میوه به صورت درختچه‌ای کوچک، خاردار با تاج پهنه است میوه این درخت تخم مرغی شکل و به اندازه میوه زیتون یا کمی کوچکتر است. طعم این میوه ترش مطبوع و شیرین است. برگ‌های کنار را می‌توان خشک و پودر کرده و جهت شستشوی بدن و مو به کار برد.



جمبو

«جمبو» نام درخت میوه دار و همیشه سبزی است که در شهرها و مناطق ساحلی جنوب ایران می‌روید. این درخت گرمسیری با نام علمی *Syzygium cumini* گیاهی از خانواده موردیان (Myrtaceae) و بومی کشورهای هند، سریلانکا، بنگالادش و اندونزی است. نام این درخت در ایران برگرفته از نام هندی آن است. امروزه علاوه بر کشورهای یاد شده، در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله فیلیپین، میانمار، بربازیل جزایر و کشورهای آمریکای مرکزی، درخت جumbo رشد می‌کند. این درخت در صدسال اخیر به جنوب ایران وارد شد. توزیع درخت جumbo از کشورهای هند و سریلانکا آغاز شد و تا جنوب چین و شمال شرقی قاره استرالیا ادامه یافت. در ادبیان بودایی و هندی درخت جumbo مقدس و محترم است. درخت جumbo درختی نسبتاً سریع الرشد است و می‌تواند تا بیش از صدسال عمر کند. این درخت شاخ و برگ‌های متراکمی دارد که سایه‌ای دلنشیینی ایجاد می‌کند.





شیشه شور مجنون

شیشه شور مجنون گیاهی همیشه سبز بوده و به صورت درختچه‌ای مرتفع یا درختی کوچک با ارتفاع ۱/۵ تا ۶ متر دیده می‌شود. پوست شاخه‌های جوانش خاکستری رنگ و ترک خورده است. شاخه‌های باریک و بلند درخت، با گذر زمان حالت مجنون به درخت می‌دهد. گیاه در حالت طبیعی تمایل به رشد چندشاخه‌ای دارد اما می‌توان آن را با هرس به صورت یک تنه وادر به رشد کرد.

شیشه شور برای رشد، نیاز به آفتاب کامل دارد. آب و هوای معتمد برای رشد این گیاه بسیار مناسب است و سرما سبب آسیب به آن خواهد شد. در انواع خاک‌های رسی، لومی، شنی، خاک‌هایی با خاصیت قلیایی کم و خاک‌های اسیدی که مرطوب بوده و زهکش خوبی داشته باشند رشد خوبی خواهند داشت. هرچند مقاومت به خشکی در این گیاه بالاست ولی بهترین شرایط برای گلدهی و رشد آن در خاک‌های مرطوب و با مواد غذایی کافی صورت می‌گیرد.



پیچک نیلوفر

پیچک نیلوفر که با نام مورنینگ گلوری در دنیا شناخته می‌شود، گونه‌ای گیاه چند ساله ازسرده یا جنس نیلوفر پیچ از خانواده پیچکیان، یومی نواحی گرمسیری بر جدید^{*} بدويژه مکزیک، آمریکای مرکزی و جنوبی می‌باشد و به طور گستره‌های در سایر نقاط جهان کشت می‌شود. این گیاه دارای گونه‌های دارای همیشه سبز، همیشه درختچه‌ای دائمی، یک ساله، پیچنده و بالارونده است. گل‌های شیپوری آن در رنگ‌های گوناگون در نیمه دوم تابستان و نیمه نخست پاییز نمایان می‌شوند.

این گیاه در طول رشد می‌تواند به ۲ تا ۴ متر بلندی برسد. دارای برگ‌های مرتب ماریچ ۳ تا ۷ سانتی متری با دمبرگ بلند ۱۰۵ تا ۱۶۵ سانتی متری است. گل‌های به شکل شیپور آن حدود ۴ تا ۹ سانتی متر قطر دارند و اغلب به رنگ آبی با مرکز سفید و زرد طلایی می‌باشند. برخی این گیاه را به علت سرعت بالای رشد و تولید بذر شگرف آن به عنوان علف هرز مهاجم می‌شناسند.

گل کاغذی

گل کاغذی بومی بزیل است و دارای گونه های مختلف می باشد. ارتفاع این گیاه در گلدان حداقل در حدود ۲ تا ۳/۵ متر است.

درختچه گل کاغذی دارای برگ های سبز نسبتاً روشن و تخم مرغی شکل - کاسه گل لوله ای و کوچک و فاقد جام گل ولی دارای برآکت های رنگین و زیبا و با رنگ های صورتی ارغوانی، قرمز یا سفید، برآکته ها اطراف گل های کرم رنگ را احاطه کرده اند.

خاک مناسب برای گل کاغذی مخلوطی از دو پنجم خاک مرغوب با گچه، دو قسمت کود پوسیده دامی و یک قسمت ماسه می باشد. خاک رس آهکی نیز برای رشد گل کاغذی مناسب است. همچنین باید توجه داشت که اگر زمستان به این درختچه آب زیاد بدهند ریشه اش می پوسد.


روش تکثیر آن کاشت قلمه چوبی در اسفند ماه در ماسه و در گلخانه، پیوند در بهار، قلمه نیمه خشبي و خوابانیدن می باشد.



برهان

درختی همیشه سبز با تاج پوشش گسترده به ارتفاع بیش از ۱۰ متر می باشد. پوست تنہ درخت غالباً شکاف دار و به رنگ خاکستری تیره می باشد. برگ های بزرگ و سبز کم رنگ آن به صورت دو بار شانه ای بوده و دارای برگچه های فراوانی است. خوش های گل به صورت سرسان و فرچه ای شکل با گل های کرم رنگ یا مایل به سفید و بسیار معطر که در اوخر زمستان و اوایل بهار ظاهر می شوند.

میوه آن به طول ۱۵-۳۰ و به عرض ۵-۲/۵ سانتیمتر، نازک و به رنگ زرد کاهی کم رنگ می باشد. این گونه علاوه بر نواحی جنوبی ایران، در آسیای گرم و مرطوب، شمال استرالیا، آفریقای گرم و مرطوب و غالباً در نواحی گرم و مرطوب جهان به فراوانی کاشته می شود. درخت برهان در سواحل جنوبی کشور به عنوان یک درخت سایه دار و زینتی کاشته شده است. با توجه به رشد قطري زیاد ریشه های این درخت بهتر است قبل از کاشت، تدبیر لازم اندیشیده شود زیرا ممکن است باعث خرابی سنگ فرش پیاده روها شود. برگ و گل این گیاه استفاده های دارویی دارد.





یاس رازقی

گل یاس رازقی گونه‌ای درختچه کوچک و یا تاک با برگ‌های براق به رنگ سبز تیره و معطر از گل‌های کوچک سفید، از جنس *Jasminum* و خانواده *Oleaceae* است. هرچند به عنوان یاسمن عربی در زبان انگلیسی شناخته می‌شود ولی بومی عربستان نیست و زیستگاه‌های بومی آن آب و هوای مرطوب استوایی جنوب و جنوب شرق آسیا است ولی در آب و هوای منطقه خاور میانه نیز رشد خوبی دارد. خاک و تغذیه مناسب برای آن، مخلوط خاک متخلک از دو قسمت پیت ماس، یک قسمت لوم، دو قسمت ماسه است. به نور محیطی زیاد نیاز دارد اما برای آبیاری همین که خاک کمی مرطوب باشد کافی است. دمای مطلب برای پرورش و مراقبت از آن نیز حدود ۱۱ سانتیگراد است.

بررسی‌های آزمایشگاهی نشان داده است که عطر گل رازقی و تیره یاس‌ها در ساعات اولیه بامداد نخستین روز شکفتن گل (حدود ساعت هشت) بیشتر از همه اوقات است.




توکوما

نام علمی: *Tecoma spp* خانواده: *Bignoniaceae*. توکوما از خانواده پیچ اناری است. از درختان و درختچه‌های مناطق گرمسیری است. خزان کننده و برگ پهن طرز قرار گرفتن برگ‌ها به صورت مرکب شانه‌ای که شامل ۲۵-۳۱ برگچه می‌باشد.

ارتفاع آن به ۴-۶ متر می‌رسد. گل‌ها از پایین خوش‌ای است. گل‌ها از پایین خوش‌به بالا باز می‌شود و تا گل‌های پیر نمیرند گل‌های جوان باز نمی‌شوند. این عاملی است که باعث می‌شود تا گیاه مدت زیادی گلدار بماند به این دلیل به آن گل بادام هم می‌گویند. گل‌ها زرد و شبپوری می‌باشد. اگر گل‌ها روی درخت کامل برسند می‌توان بذرها را پس از خشک کردن جدا کرد و تا یک سال هم قابل نگهداری هستند. بذرها سبک و کاغذی هستند. به عنوان تک درخت و یا ردیفی در حاشیه‌ها کاربرد دارد. توکوما گل ملی کشور باهاما است.





فصل ۶۰م

کیا ہان فصلی

شب بو

این گیاه از خانواده شب بو **CRUCIFERAE** بوده، دارای گونه‌های یک ساله و چندساله است که به صورت یک ساله یا دو ساله به کار می‌رond. گونه *M. incana* در گل کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دارای گل‌های کم پر و خوش‌های کم گل به رنگ‌های مختلف و به هنگام شب بسیار معطر است. برای گل کاری در ایام نوروز مورد استفاده قرار می‌گیرد. دارای ^{*}واریته‌های پاکوتاه و بلند می‌باشد که نوع کوتاه آن را شب بو مجلسی می‌نامند. ارتفاع نوع پا بلند ۷۵ - ۳۰ سانتیمتر و نوع پا کوتاه ۲۰ - ۱۵ سانتیمتر است.

گل‌های کم پر یا پرپر که در یک یا چند گل آذین خوش‌هی افراشته قرار گرفته‌اند و به رنگ‌های صورتی، سفید، قرمز لاکی، بنفش کم رنگ، عنابی روشن، زرد کم رنگ مایل به شیری دیده می‌شوند. انواع پرپر معمولاً بذر نمی‌دهند و تک شاخه هستند.



کوکب کوهی

کوکب کوهی، گیاهی دائمی، چند ساله از جنس **Rudbeckia** در خانواده **Asteraceae** بومی شمال شرقی و جنوب شرقی آمریکا است و می‌تواند تا ۱۲۰ سانتی متر قد بکشد.

این گیاه در باغ خیلی سریع گسترش می‌یابد و از هر دو طریق ساقه و دانه زیاد می‌شود. کوکب کوهی دارای ساقه پرز دار، مضرس ^{*} و به رنگ سبز تیره می‌باشد. برگ‌ها نیز سبز تیره، پراکنده و قریباً پرز دار، ساده و با حاشیه دندانه‌ای هستند. گل آن، با گلچه سیاه و سفید و نارنجی درخشنan به تنها‌ی در انتهای ساقه و بالاتر از شاخ و برگ نمایان است.

برگ‌ها دارای پرهایی هستند که نیزه‌ای گستره تخم مرغی یا بیضی شکل با لوب و بعضی قلبی شکل با حاشیه دندانه‌ای هستند. سطح فوکانی برگ معمولاً بدون کرک یا با موهای ریز و زبر است.

کوکب کوهی نیازمند نور کامل آفتاب، رطوبت و آبیاری کم و دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد و خاک حاصلخیز با زهکشی خوب می‌باشد. و در کل نیاز به نگهداری

آهار

موطن آهار مکزیک است. گیاهی است یک ساله با برگ های نسبتاً پهن، دراز و نوک تیز که تا حدودی خشن بوده و به صورت متقابل و بدون دم برگ هستند. رنگ برگ های آن کمی به خاکستری می گراید. دارای انواع کم پر و پر است. رنگ گل ها متنوع بوده، به طوری که مجموع آن منظره بسیار جالبی ایجاد می کند. برخی ارقام دارای گل برگ های دارای دو رنگ و در برخی گلبرگ ها کمی پیچیده هستند.

دارای ارقام پا کوتاه با ارتفاع ۳۰ سانتیمتر و ارقام پا بلند با ارتفاع ۸۰ سانتیمتر است و دارای انواع گل درشت و گل ریز است و به طور کلی گیاهی با تنوع زیاد است. این گل از زیباترین گل های زمستانه و تابستانه بوده در حاشیه کاری، باغچه و به عنوان گل بریدنی استفاده می شود.

رشد آهار از زمان کاشت بذر تا گلهای آن ۱۵۰ تا ۲۰۰ ماه طول می کشد. گرمای تابستان گلهای آن را متوقف نکرده و مرتب گل های جدیدی را می توان روی آن مشاهده کرد.



ختمی

ختمی گیاه بومی مناطق شرق مدیترانه است.

گیاهی است علفی و چند ساله که ارتفاع آن به حدود ۲ متر می رسد ساقه آن از کرک های ریز که به رنگ خاکستری می باشد پوشیده شده است. برگ های ختمی دندانه دار، پهن و مانند قلب می باشد. گل های آن درشت به رنگ سفید مایل به قرمز با ارغوانی است که به صورت دسته های سه تایی در اواخر تابستان ظاهر می شود. ختمی به علت داشتن گل های زیبا به صورت گیاه زینتی در باغچه ها کاشته می شود.

ختمی چند نوع می باشد: ختمی بنفش، ختمی سفید، ختمی سیاه تمام قسمت های این گیاه استفاده طبی دارد و خواص ختمی بنفش بیشتر می باشد.

ختمی از نظر طب قدیم ایران سرد و تر است و به طور کلی روی تمام اعضای بدن مخصوصاً روده ها، ریه ها، معده، کلیه ها و مثانه موثر است.





شمعدانی

معمولاً چند ساله بوده و ارتفاع آن ها در طبیعت در حدود یک تا ۲ متر هم می رسد شمعدانی برگ های بزرگ، کرکدار و کروی دارد. گل ها بزرگ و به رنگ سفید، قرمز و بنفش و به شکل گل آذین چتر ساده روی ساقه ظاهر می شوند.

این گیاه به نور زیاد، گرمای معمولی، آبیاری فراوان، رطوبت کم تا متوسط و خاک قلیایی احتیاج دارد. کود مورد نیاز شمعدانی را باید به میزان ۵ گرم در لیتر هر هفته یک بار، از اردیبهشت تا شهریور استفاده کرد. انواع شمعدانی را می توانید به آسانی از اوایل تا اواخر تابستان تکثیر نمایید. قلمه های انتهایی ساقه را با یک چاقوی تیز به طول ۱۰ سانتیمتر جدا کنید و سپس انتهای قلمه را پس از جدا کردن برگ های پایینی در پودر هورمون ریشه زایی فرو برد و در گلدانی با قطر دهانه ۹ سانتیمتر، حاوی کمپوست بذر و قلمه قرار دهید. لازم است فقط کمی آنها را مرطوب نگهدارید. ریشه دهی قلمه شمعدانی یک ماه طول می کشد.

گل اطلسی

گل اطلسی گیاهی است یک ساله که در صورت وجود دمای مناسب به صورت گیاهی چندساله رویش خواهد کرد از جنس **Petunia** و بومی آمریکای جنوبی معمولاً دارای گل های دو رنگ ترکیبی است. این گل محبوب نام خود را از کلمه فرانسوی **petun** به معنی "تبناکو" گرفته است.

خانواده سولاناسه را در فارسی تحت نام خانواده سیب زمینی می شناسند. گیاهان زینتی این خانواده شامل فلفل زینتی، داتوره، توتون زینتی و گل اطلسی می شود. گل اطلسی از گیاهان حساس به سرما به شمار می رود و گیاهی است که بعد از استقرار، رشد نسبتاً سریعی دارد و ارتفاع آن ممکن است به بیش از ۶۰ سانتیمتر برسد. ساقه های آن بلند، پرزدار و منشعب بوده و این رشد زیاد عموماً به آن ظاهری متراکم می دهد.

گل اطلسی گیاهی است تا حدودی گرما دوست و روشناهی پسند. نور مستقیم آفتاب باعث شکوفایی گل هایش می گردد. مراقب باشید وقتی خاک آن خشک شد به آن آب بدهید.

ناز گوشتی

این گیاه از خانواده گیاهان گوشتی (در دو گونه ساده سبز رنگ و دو رنگ سبز و سفید) می‌باشد، گیاهان گوشتی گیاهانی هستند که دارای برگ‌ها و ساقه‌های ضخیم و آبدارند. از آن جایی که شباهت‌های زیادی به کاکتوس‌ها دارند، گاهی با یکدیگر اشتباه می‌شوند اما نسبت به کاکتوس‌ها سرعت رشد بیشتری داشته و تکثیر آنها سریع‌تر انجام می‌پذیرد. گیاهان گوشتی مانند کاکتوس‌ها بسیار مقاومند و اغلب شان به نواحی گرم و کم آب تعلق دارند. با توجه به این که این گیاهان می‌توانند برای موقع کم آبی مقدار زیادی آب در برگ‌های خود ذخیره کنند، شرایط نگهداری آنها نیز تا حدودی با کاکتوس‌ها مشابه است. تفاوت گیاهان گوشتی و کاکتوس‌ها در برگ‌هایشان است. کاکتوس‌ها برگ مشخصی ندارند، در حالی که برگ گیاهان گوشتی تا حدودی مشخص است. این گیاه را می‌توان به راحتی در آپارتمان پرورش داد. بهترین فصل برای کاشت این گیاه اواخر زمستان است. طریقه ازدیاد این گیاه قلمه و کاشت بذر می‌باشد.




گل میمون

گل میمون گونه گیاهی چندساله و گل دار از جنس *Antirrhinum* در خانواده بارهنگ (Plantaginaceae) یومی منطقه مدیترانه است، نام «گل میمون» سرچشمه از واکنش گل به فشردن گل‌لای آن دارد؛ که باعث می‌شود که "دهان" گل باز شود.

گل میمون در باغبانی بسیار معمول است و در فصل تابستان با گل‌های رنگارنگ و مخلی خود جلوه خاصی به باغچه‌ها می‌دهد.

ارتفاع این گیاه در واریته‌های مختلف بین ده سانتیمتر تا یک متر متغیر است. از فرم‌های بلند آن برای گل بریده و از فرم‌های کوتاه آن برای کاشت در حاشیه باغچه‌ها می‌توان استفاده کرد.

طول گیاه گل میمون و رنگ و اندازه گل در واریته‌های مختلف متفاوت بوده و همین تنوع این گونه را جزء یکی از پر استفاده ترین گیاهان در گل کاری قرار می‌دهد.






همیشه بهار

گل همیشه بهار (نام علمی: *Calendula persica* یا *Calendula officinalis*) از گونه *Calendula officinalis* است. همیشه بهار گیاهی از تیره ستاره‌ای، علفی و پایا است. ساقه هوازی افراشته منشعب، دارای پرهاهی غده‌ای و گل آن زرد رنگ می‌باشد. همیشه بهار در ایران از جمله در بلندی‌های بالای ۲۵۰۰ متر در استان کهگیلویه و بویراحمد می‌روید.

گیاهی علفی، یک ساله دارای ساقه‌ای به طول ۲۰ تا ۵۰ سانتی متر است، برگ‌هایی ساده، بیضوی، دراز، پوشیده از کرک، با کتاره‌های موجود و به رنگ سبز مایل به قهوه‌ای روشن است، روی ساقه منشعب آن کاپیتول‌های درشت و زیبا ظاهر می‌گردد که به تناسب گرما و رطوبت محیط زندگی، به طور منظم صبح‌ها در فاصله ساعت ۹ تا ۱۰ شکفته و سپس در بعد از ظهرها بین ساعات ۴ تا ۵ جمع‌می‌گردد. کاپیتول‌های آن دارای دو نوع گل یکی لوله‌ای و دیگر زبانه‌ای به رنگ زرد مایل به نارنجی و واقع در حاشیه نهنج است.



مینا

گل مینا (*Chrysanthemum leucanthemum L.*), گیاه چندساله‌ای از خانواده‌ی پاناسه آ و از تیره مینا است. گل مینا در شمال ایران رویش فراوانی دارد. طول گیاه ۷ تا ۱۵ سانتی‌متر، با گل‌هایی به رنگ‌های متنوع و زیبا می‌باشد.

این گیاه دارای خاصیت دارویی است و در درمان سردردهای میگرنی بسیار موثر است. از دانه‌ی این گیاه روغن گل مینا یا **EPO** تهیه کرده در کشورهای اروپایی در داروخانه بنام کپسول اپو به فروش می‌رسد. این کپسول حاوی ۲۵۰ میلی گرم و یا ۵۰۰ میلی گرم روغن گل مینا است. علاوه بر این مخلوط روغن گل مینا و ویتامین E به نام **Efamol** و نیز مخلوط روغن گل مینا و روغن ماهی را به نام **Marin cap** به فروش می‌رسانند. روغن گل مینا حاوی اسیدهای چرب ضروری ازنوع اسید لینوئیک (۷۰ درصد) و اسید گاما‌لینوئیک (۹ درصد) می‌باشد. اسیدهای چرب ضروری برای رشد و تکثیر سلول‌های بدن ضروری هستند.

ناز آفتابی

گل ناز با رنگ های زیبا و متنوعش باعچه تان را با نشاط و زیبا خواهد کرد. گل ناز یک گیاه چند ساله و با دوام با برگ های گوشته و آبدار است. این گل در گونه های متنوع در اندازه های مختلف از ۵ تا ۸ سانتی متر ارتفاع وجود دارد. انواع کوتاه تر رایج ترند و برای پوشاندن سطح زمین مورد استفاده قرار می گیرند. رشد دادن گیاه ناز بسیار آسان است و نیاز چندانی به مراقبت ندارد. گیاهان از تابستان تا پاییز شکوفه هایی به رنگ های زرد، قرمز صورتی و نارنجی می دهند. این گل ها زنبور های عسل و پروانه ها را به سمت خود جذب می کنند. یک ترجمه قدیمی از متون انگلیسی وجود دارد که می گوید «در باغ شما تنها سنگ است که بیشتر از گل ناز عمر کرده و به مراقبت کمتری نیاز دارد.» گونه های کوتاه تر را برای پوشش زمین مورد استفاده قرار دهید و گونه های بزرگ تر به صورت گروهی در تپه ها رشد داده می شوند. گل ناز در باغ ها اغلب برای مرز بندی استفاده می شود.



لادن

لادن در حدود ۵۰ گونه گیاه علفی یک ساله یا چند ساله دارد که بومی آمریکای جنوبی از مکزیک تا شیلی هستند. در این بین لادن غده دار که بومی پرو است طرفداران بیشتری دارد. لادن گیاهی است بوته ای، یک ساله، سریع الرشد با ساقه های بالا رونده که ارتفاع آنها به چند متر نیز می رسد. بیشتر بخش های این گیاه به ویژه برگ هایش طعم شاهی (نوعی سبزی) می دهد از این رو به آن شاهی هندی هم می گویند. گل ها مهمیزدار، شیبور مانند، به رنگ زرد و نارنجی از اوایل تابستان تا اوایل پاییز پدیدار می شوند. مکان آفتابی، خاک به خوبی زهکشی شده و غنی از مواد آلی را می پسندد. نسبت به سرما نسبتاً مقاوم است. در صورت مشاهده شته باید گیاه را فوراً با آب شست و شو داد. تکثیر آن از طریق کاشت بذر در اوخر اسفند و قلمه زدن در اوخر تابستان امکان پذیر است. بدین ترتیب که از روی بوته های مادر قلمه هایی انتخاب کرده و در مخلوطی از خاک برگ و ماسه می کارند و پس از ریشه دار شدن گلدانش را عرض می کنند.



تاج خروس

تاج خروس نوعی از گیاهان گلدار است که دارای ۶۰ گونه متفاوت می‌باشد. گل‌های این گیاه به رنگ‌های بنفش، قرمز و زرد است. بسیاری از اعضای این خانواده ویژگی‌ها و کاربردهای مشابهی با اعضای سرده سلوسیا دارند. گیاه تاج خروس باید در معرض نور کامل خورشید قرار بگیرد و خاکش نیز باید ماسه‌ای، زهکش و غنی باشد.

اگرچه چندین گونه در این سرده علف هرز محسوب می‌شوند ولی مردم در سراسر دنیا از گونه‌هایی از این گیاه به عنوان سبزی، غلات و گیاه زینتی استفاده می‌کنند.

تاج خروس سرشار از مواد معدنی مانند کلسیم، پتاسیم، آهن، مس، منیزیم، فسفر و منگنز است. میزان مناسب پروتئین و لیزین موجود در این گیاه برای سلامت موها و ناخن‌ها مفید است. گیاه تاج خروس باعث کاهش کلسترون شده و به این ترتیب خطر سکته‌ی قلبی و بیماری‌های قلبی عروقی را کاهش می‌دهد. برخی گونه‌های تاج خروس نیز به عنوان گیاه زینتی کاربرد دارند.

پریوش

پرورش پریوش آن چنان ساده می‌باشد که در یک مورد دیده شده این گیاه پس از کاشت بدون هیچ رسیدگی به مدت ۳۰ سال رشدکرده است. وینکایا پریوش از آن دسته گیاهانی است که برای پرورش بسیار مناسب می‌باشد. زیرا گیاهی همیشه سبز است و همچنین نسبت به گرما و کم آبی بسیار مقاوم می‌باشد. رسیدگی و پرورش آنها بسیار ساده و کم زحمت می‌باشد. در یک مورد مشاهده شده است که یک نفر ۳۰ سال قبل در یک نقطه این گیاه را کاشته و هر سال خود به خود و بدون هیچ رسیدگی گیاه دوباره سر از خاک ببرون آورده است.


موطن اصلی گیاه پریوش آمریکای شمالی، اروپا، چین و هند است. این گیاهان به خاطر برگ‌های براق و سبز و گل‌های زیبایشان معروفند. این گیاه گل‌های خود را در تمام طول تابستان تا پیش از رسیدن موعده سرما شکوفا می‌کند.

رنگ گل‌های آن سفید، صورتی و قرمز است.



جعفری

گل جعفری از خانواده آفتابگردان می باشد گیاهی است یک ساله تا چندساله که در صورت فراهم آوردن شرایط نگهداری مطلوب می تواند تا چند سال به گلهای ادامه دهد . گل جعفری بیش از ۵۰ گونه دارد که مناسب ترین گونه های آن برای پرورش، جعفری فرانسه (گل کوچک) و جعفری مکزیکی (گل بزرگ) هستند. رنگ گل ها عموماً زرد و نارنجی هستند. ارتفاع گل های گل کوچک بین ۳۰ تا ۵۰ سانتیمتر و گل بزرگ بین ۵۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر است. حداقل رشد این گل ها در سال دوم اتفاق می افتد. گل دهی جعفری از اواخر بهار تا فصل سرما می باشد، در گرمای مرداد کمی از گلهای گیاه کم می شود و سپس با فروکش کردن گرمای هوا مجدداً گیاه به گل می نشیند و تا شروع فصل سرما گلهای ادامه پیدا می کند .



کوکب باگی

گل کوکب بومی مناطق مرتفع مکزیک و دیگر کشورهای آمریکای مرکزی می باشد کوکب شامل ۴ بخش، ۲۷ گونه و ۴ نوع درون بخشی است و از خانواده کمپوزیته است گل کوکب دارای انواع پاکوتاه و افراشته می باشد ساقه بیشتر این گل ها توالی است و ابتدا دارای برگ های ساده و سپس برگ های مرکب می شوند بعد از تشکیل ۵ تا ۷ جفت برگ مریستم های انتهایی یک گل تولید کرده و گل ها دیگر به تدریج روی محور های برگی، شکل می گیرند. گل های کوکب اواخر تابستان و اویل پاییز ظاهر می شوند. برای بدست آوردن بوته های تازه ای کوکب یک راه تقسیم غده های ریشه آن و یا قلمه زدن است. برخی از گونه های کوکب را می توان بوسیله کاشت بذر در اواخر زمستان در گلخانه نیز تکثیر کرد .



رژ



گل رز یا گل سرخ، گیاهی چندساله چوبی از جنس رزا (*Rosa*) و خانواده **Rosaceae** که دارای بیش از ۱۰۰ گونه از گیاهان گل دار است می باشد. همه آنها گل های زیبایی در رنگ های بسیار متنوع از سفید تا زرد و قرمز هستند. اکثر گونه های آن بومی آسیا، و بعضی گونه ها بومی اروپا، شمال آمریکا و شمال غرب آفریقا می باشند. گونه ها و ارقام متنوع و ترکیبی گل رز به خاطر زیبایی و عطر آنها افزایش یافته است. گل های رز در اندازه های گل رز مینیاتوری و بسیار کوچک تا گل هایی که می توانند ارتفاعی تا هفت متر داشته باشند وجود دارند. گل رز نام لاتین خود را از زبان فرانسه گرفته است.

رزهای خشکیده ای از ۳۰۰ سال قبل از میلاد در گورهای مصریان بدست آمده است. ولی تحقیقات وسیع نشان می دهد که این گل بومی مصر نبوده و از آسیای صغیر به آنجا آورده شده است.

محبوبه شب


گل محبوبه شب درختچه ای چوبی چندساله با یک یا چند ساقه سبز شکننده است و می تواند به ارتفاع ۲ تا ۳ متر رشد کند. دارای برگ های سبز و براق متنابوب به طول ۱۲ سانتی متر و گل های کوچک لوله ای زرد و سبز با حدود ۲/۵ سانتی متر طول در انتهای ساقه می باشد که از اواخر بهار تا پاییز نمایان می شود. میوه آن خوش کوچک مانند توت و تخم مرغی شکل به رنگ سیاه و سفید در تابستان و پاییز دیده می شود.

محبوبه شب دارای ریشه عمودی اصلی عمیق و پایدار است. برگ های این گیاهان عموما ساده و بیضی شکل و اطراف برگ ها صاف و صیقلی می باشد. اگر برگ این گیاهان را در بین انگشتان بفشارید (له کنید) بوی بسیار نامطبوعی از آن به مشام می رسد.

رنگ گل ها در انواع گوناگون متفاوت است و به رنگ های سفید، سبز، زرد، قرمز بنفش تیره دیده می شوند. بعض از انواع محبوبه شب دارای گل های معطر در شب هستند.







فصل سوم

کیاہن آپارٹمنی



بنجامین آمستل

بنجامین آمستل یا فیکوس آمستل یا فیکوس برگ دراز از خانواده موراسه و بومی هلند می‌باشد که بسیاری به اشتباه به آن آمستر می‌گویند.

این نوع از **ficus** دارای برگ‌های بلند و باریک می‌باشد. بسیار مناسب برای منزل و یا گلخانه می‌باشد. دارای شاخ و برگ نسبتاً زیاد بوده ولی گل ندارد. به نور فراوان نیاز دارد اما از تابش مستقیم نور خورشید اجتناب شود؛ لذا در کنار پنجره‌های جنوبی باید از پرده استفاده شود یا تابش غیر مستقیم بر گیاه صورت گیرد.

دماه مناسب برای آمستل بین ۱۶ تا ۲۹ درجه سانتیگراد است و دمای پایین تر از ۱۰ تا ۵ درجه را برای مدت کوتاهی تحمل می‌کند. در تابستان هفته‌ای دو بار و در زمستان هفته‌ای یک بار و با آب ولرم باید آبیاری شود، زیرا آب سرد موجب آسیب به برگ‌ها و ریزش آنها می‌شود. خوب است برگ‌های گیاه هر دو روز یکبار با اسپری غباریاشی شود و در طول بهار و تابستان هر دو هفته با کودهای محلول در آب تعذیبه شود.

بنجامین بلک

بنجامین از آن دسته گیاهانی است که در خیلی از خانه‌ها پیدا می‌شود ولی افراد کمی هستند که به خوبی از روش‌های نگهداری آن آگاهند و دقیقاً می‌دانند چطور با این گیاه بخورد کنند، در واقع وقتی این گیاه را می‌خرند پر برگ و شاداب است اما بعد از مدتی ماندن در اتاق آن شادابی روزهای نخست خود را از دست می‌دهد. این گیاه بسیار زیبا از خانواده انجیر (موراسه) که برگ‌های کوچک با رنگ سبز تیره (بنجامین بلک) و سفید و سبز به صورت ابلق دارد. معمولاً بنجامین را بهدلیل حساسیت بالا و مقاومت کم در برابر عوامل محیطی روی فیکوس بنجامین پیوند می‌زنند تا مقاومتر شود.

این گیاه به نور بیشتری نسبت به سایر گیاهان آپارتمانی نیازمند است اما تابش مستقیم آفتاب را تحمل نمی‌کند، در واقع باید گفت معمولاً بهترین نور در حالتی است که گلدان زیر سایه‌بان جنوبی قرار گیرد که آفتاب به گلدان گیاه برسد اما به برگ‌های گیاه آفتاب نتابد و برگ‌ها در سایه (نور کامل) باشند.

پنجه غازی


گیاه پنجه غازی، از انواع گیاهان زیبا با قابلیت کاشت آسان در فضای آپارتمان است. قبل از کاشت، گلدان ها را با خاک غنی از ماسه، سنگریزه و خزه پر کرده و آنها را آبیاری کنید.

خاک گیاه باید همیشه مرطوب بوده و توصیه می شود، گلدان ها را در مکانی سایه، به دور از تابش مستقیم نور خورشید قرار دهید.

برای زهکشی بهتر خاک می توان در کف گلدان، دو یا سه سوراخ ایجاد کرد. دقیت کنید قبل از آبیاری مجدد، خاک گیاه همیشه مرطوب باشد. گیاه پنجه غازی برای رشد، نیاز به رطوبت دارد از این رو توصیه می شود از دستگاه بخور برای تأمین رطوبت استفاده کنید.

هر چهار هفته یک بار خاک گلدان را با بارور کننده های مایع یا جامد مخلوط کنید. گیاه پنجه غازی از انواع گیاهان رونده است و می توان آن را برای تزئین گلدان ها در سبد و آویزها کاشت.

تکثیر این گیاه از طریق قلمه زدن در فصل بهار امکان پذیر است.



پاندانوس

زیبایی خاص این گیاه زینتی به دلیل روییدن برگ ها در طول محور ساقه است که در صورت قرار دادن آن روی پایه و یا در محل بلند نظرها را به خود جلب می کند. در کلیه منازل با شرایط آپارتمان خود را سازگار نشان داده است، برگ ها کشیده و بلند سبز و دارای خطوط سفید و کرمی و زرد رنگ، در سرتاسر حاشیه برگ ها از قاعده تا نوک مملو از دندانه های ظرفی و خار مانند است، با زیاد شدن سن گیاه احتیاج به جا و مکان بیشتری دارد. در محل اتصال برگ با ساقه جوانه هایی با ریشه های کوچک می رویند که قابل انتقال به گلدان دیگر هستند. گیاه پاندانوس، آن چنان که به نظر می آید به آسانی تکثیر نمی شود و تنها با توجه و دقیق تر زیاد می توان به نتیجه مطلوب رسید.

به نور کافی و تقریباً آفتابی احتیاج دارد، ولی نور آفتاب ظهر به گیاه صدمه می رساند، اگر محیط دارای نور کافی نیست هر چند وقت یک بار به محل پر نورتر انتقال دهید، در غیر این صورت برگ ها سبزی و شادابی خود را ازدست می دهند.



برگ بیدی

این جنس داری ۶۰ گونه از گیاهان خشبي و علفي چند ساله می باشد. انواع علفي آن به عنوان گیاهان آپارتمانی پرورش داده می شوند. گونه مذکور بومي آمریکای جنوبی است و برگ هاي زبيا و مناسب برای آويز دارد.

این برگ ها تخم مرغى شكل، پهن و بدون دم برگ و به رنگ سبز روشن با نوارهای سفید يا کرم می باشند. برگ بیدی به سایه تا نور متوسط، گرمای زیاد خاک همیشه خیس، رطوبت ۵۰ تا ۷۰ درصد و خاک قليایي احتیاج دارد.

این گیاه به سرعت در آب و يا خاک ريشه می دهد. از اواسط بهار تا اواخر تابستان که گیاه مادری تجدید رشد می کند؛ شاخه ها آن باید سرزني و جوان شوند. می توانيد شاخه هاي هرس شده را به طول ۷/۵ سانتيمتر جدا کرده و هر ۵ قلمه را در گلدانی با قطر دهانه ۹ سانتيمتر حاوي کمپوست مخصوص بذر و قلمه قرار دهيد. خاک را نسبتاً مרטوب کنيد و گلдан را در دمای ۱۸ درجه سانتيگراد و نور كافی نگه داريد. پس از ۲ تا ۳ هفته ريشه دهی انجام می شود در شرایط مشابه، قلمه ها در آب نيز ريشه خوهند داد.

حسن یوسف

حسن یوسفها گیاهان دوامی بوده و پرورش آنها ساده است. اين گیاه به خاطر رنگ روشن و تنوع شکل برگهاي شمع معمولاً پرورش دهندها و تولید کنندها گیاهانی هميشگی و حساسی هستند، اما معمولاً پرورش دهندها و تولید کنندها بذر اين گیاه، آنها را گیاهان سالیانه می دانند. حسن یوسف باید در باعچه های روشن و در نور غير مستقيم خورشید يا در مکانی نیمه آفتابی پرورش داده شود. گونه های کم رشد و کوتاه این گیاه حاشیه رنگارنگی در باعچه تان ایجاد می کند. می توانيد از گونه بلند آن به عنوان پس زمینه ای چشمگیر برای باعچه خود استفاده کنید.

بسیاری از این گیاهان در برابر نور كامل خورشید دوام می آورند، اما در صورتی که در سایه پرورش داده شوند رنگ برگها تیره تر خواهد بود. این گیاه در گلدان نیز چهره بسیار زیبا و جذابی دراد.

با جدا کردن سرگلها و چیدن شاخ و برگ های آن، این گیاه می تواند سالها

عمر کند.



دیفن باخیا

گیاهی است با برگ های زیبا از خانواده آراسه که گاهی در صورت بالا بودن سن گیاه و مهیا بودن شرایط گل می دهد که البته خیلی کم دیده می شود. گل های آن قابل توجه نمی باشند و بهتر است با چاقوی تیزی بریده شوند تا نیروی گیاه بیهوده به هدر نرود. دیفن گیاهی مقاوم است و به دلیل سادگی نگهداری در اکثر آپارتمان ها دیده می شود.

دیفن باخیا به نور متوسط، گرمای زیاد، خاک همیشه خیس، رطوبت هوای ۷۰ تا ۹۰ درصد، خاک قلیایی تا کمی اسیدی احتیاج دارد. دما در زمستان نباید کمتر از ۱۶ درجه سانتی گراد باشد ولی تا ۱۳ درجه سانتیگراد را نیز تحمل می کند.

در حرارت ۷ درجه سانتیگراد گیاه برای مدت کوتاهی زنده می ماند ولی برگ های پائینی خود را سرعت از دست می دهد. در حرارت مناسب گیاه برای تمام سال بدون توقف به رشد خود ادامه می دهد.

دیفن باخیا از گیاهان سمی می باشد. شیره گیاهان این جنس سمی است و باید از تماس آن با چشم و دهان اجتناب کرد. بنابراین در امور تکثیر و جابه جایی آن باید مراقبت کنید و از دستکش استفاده نمایید.

دراسنا نقره ای

زیبایی پاسیو ها با برگ های برآق و چشم نواز دراسنا برگ بلالی دوچندان می شود و این گیاه، از گیاهان آپارتمانی پر طرفدار است. بومی مناطق استوایی غرب افریقا است و در آنجا ارتفاع آن به ۴,۵ الی ۱۵ متر هم می رسد، اما در نگهداری آپارتمانی ۱ الی حدود ۲ متر قد می کشد. با خاطر نگهداری آسان و دوام و سرعت رشد کند، دراسنا برگ بلالی تا مدت ها جایش را در ترکیب دکور آپارتمان حفظ می کند.

برگ های نیزه مانند دراسنا بلالی، به طول حداقل ۶۰ سانتیمتر و پهنای ۷,۵ سانتیمتر و به رنگ سبز برآق هستند. برگ های جوان تر راست تر بر ساقه گیاه می ایستند برگ های مسن تر و بزرگتر به خاطر وزنشان حالت آویخته دارند و با سپری شدن عمرشان از پایین گیاه می افتد و ریشه ها را نمایان می کنند.



گندمی

این جنس دارای ۲۱۵ گونه مختلف از گیاهان همیشه سبز گلخانه ای می باشد. ارتفاع این گیاه در حدود ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر می رسد. برگ های خطی و باریک آن حدود ۲۵ سانتی متر طول دارد و به صورت نوارهای سبزی به نظر می رسد که در میان هر یک نوار سفید رنگی مشاهده می شود. در بعضی از گونه ها برگ ها سفید و قسمت میانی سبز می باشد.

در تابستان گیاه گندمی گل می دهد که دمگل طویلی به طول ۶۰ سانتیمتر دارد. گل آذین آن به شکل پانیکول بوده و گل های سفید و ستاره ای آن دارای قطری حدود ۲/۵ سانتیمتر هستند.

در انتهای دمگل و نزدیک گل، گیاهچه های جدید تولید می شود که می توان آنها را از گیاه جدا نموده، ریشه دار کرد.

گندمی را باید نزدیک پنجره قرار داد، زیرا چنانچه دور از نور قرار بگیرد برگهایش طویل می شوند که چندان زیبا نیست.

این گیاه به نور کم تا متوسط، گرمای معمولی، خاک همیشه خیس، رطوبت هوای ۷۰ تا ۸۰ درصد و خاک قلیابی احتیاج دارد.

لیندا (پا فیلی)

این گیاه به تخل دم اسپی و لیندا مشهور است بومی جنوب غرب آمریکا و مکزیک است و به زندگی بیابانی عادت دارد. برگ های آن باریک و کشیده و ضخیم مقاوم، مجنون، آویزان و فنری است. این برگ ها سطح مقطع کمی دارند تا مانع از هدر رفتن آب گیاه شوند.

حالت زیبای آن ناشی از سرازیر شدن برگ ها به طرف پایین بخصوص در سنین بالاست. انتهای ساقه ضخیم می شود و شکل عجیبی به خود می گیرد و نام انگلیسی آن (به معنی پای فیل) به همین علت است. پایه بسیار بزرگ و ورم کرده گیاه، آب را در خود ذخیره می نماید.

ارتفاع لیندا ممکن است به دو متر هم برسد. با بالا رفتن سن گیاه از ساقه آن جوانه هایی می روید که به خاطر حفظ شکل و فرم آن باید فوراً حذف گردد. نگهداری از آن برای باغبان های آماتور نیز ساده است.

کاج مطبق

اصل آن از استرالیا است و شاخه های آن طبقه طبقه هستند و در گلدان کاشته می شود.

گیاهی است همیشه سبز و دارای برگ های سوزنی ، شاخه های تحتانی خود را به مرور زمان از دست می دهد یک نوع آن دارای قد کوتاهی است که در گلدان کاشته می شود در تایستان می توان گلدان آن را در هوای آزاد و نیمه سایه یعنی در سایه سایر درختان قرارداد.

تکثیر کاج مطبق در خانه بسیار مشکل و تقریباً ناممکن است. برای تکثیر از بذر یا قلمه استفاده می شود که البته قلمه باید از انتهای ساقه گیاه باشد در غیر اینصورت گیاه حاصل کج در می آید. در نوک این کاج ساقه فوقانی قرار دارد که به صورت عمودی و رو به بالا است. اگر این ساقه آسید بیند و یا قطع شود چند ساقه دیگر در محل بریدگی بوجود می آید که برای تکثیر از آن ها می توان استفاده نمود. البته قلمه را باید با استفاده از هورمون ریشه زا مثل آسید ایندول بوتیریک ریشه دار کرد .



کروتون

این جنس دارای ۱۵ گونه مختلف از نوع درختچه های همیشه سبز است . بومی مالزی می باشد. در گلدان ارتفاع آن به ۶۰ سانتی متر و گسترش آن به ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر می رسد. در خارج از گلدان ارتفاع این گیاه از ۳ متر تجاوز می کند. برگ های کروتون عموماً مخلوطی از سبز، سفید، زرد، قرمز، صورتی سیاه و نارنجی می باشد. شکل برگ ها متنوع از خطی تا تخم مرغی است. کروتون به رطوبت زیاد احتیاج دارد و اگر در منازل در نواحی خشک، رطوبت به اندازه کافی وجود نداشته باشد برگ ها شروع به ریزش نموده و به مرور باعث از بین رفتن گیاه می شود. اسپری آب روی برگ ها مشکل را کاملاً بر طرف نمی کند ولی تا اندازه ای در نگهداری آن موثر است.

درجه حرارت مناسب کروتون در زمستان ۱۶ درجه سانتی گراد می باشد. آبیاری بیش از حد باعث پوسیدگی ساقه و ریزش برگ ها می گردد.



پیتوس



پیتوس گیاهی برگ زینتی و آپارتمانی است. برگ های قلبی شکل دارد. بسیاری از گونه ها حالت بالارونده دارند و تا سقف بالا می روند.

دو نوع دارد: پیتوس برگ معمولی و پیتوس برگ ابلق.
با اینکه هر دو مقاوم به سایه هستند، ولی نوع ابلق آن، نیاز به نور کمی بیشتر برای تشکیل رنگدانه دارد.

در صورتی که نور کافی دریافت نکند، برگ ها به سبزی گرایش پیدا می کنند.
پیتوس ها، در منازل به راحتی قابل نگهداری هستند. نیاز به نور مستقیم خورشید ندارند، و در صورت دریافت نور مستقیم، آفتاب سوختگی به صورت تاول و سوختگی روی برگ ها نمود پیدا می کند.


به رطوبت کم محیط مقاوم است و در صورتی که رطوبت بسیار بالا باشد برگ ها خیلی پهن و درشت می شوند. با اینکه به راحتی روی دیوار قابل هدایت است، اما ممکن است در قسمت های بالایی و نزدیک به سقف، در اثر تجمع هوای گرم ادبار سوختگی شود و در نتیجه گیاه بد شکل می شود.

یوکا




گیاهی است زیبا از خانواده آگاواسه با برگ های کشیده و خنجری نوک تیز و به رنگ سبز؛ این گیاه دو گونه دارد یکی که فاصله برگ ها در آن زیادتر است و گل نمی دهد و این نوع برای آپارتمان بیشتر توصیه می شود و نوع دیگر که فاصله برگ های آن کمتر است و گل هایی به شکل زنگوله‌ی واژگون و سفید و کرم رنگ می دهد و برای کشت در باگچه مناسب تر است. هر دو گونه را می توان هم در آپارتمان و هم در باگچه نگهداری کرد.

این گیاه نسبت به شرایط نامساعد نور، دما و هوا بسیار مقاوم است و در هر جای خانه می توان از آن استفاده کرد و به همین دلیل در اکثر خانه ها دیده می شود.
در تابستان آن را همیشه مرطوب نگهدارید و هر ۳ تا ۴ روز یک بار آبیاری نمایید. در زمستان بین دو آبیاری اجازه دهید تا سطح خاک گلدان خشک شود.
















واژه نامه

آبیاری غرقابی

در روش آبیاری غرقابی آب را در سطح خاک جاری می‌سازند بطوری که تمامی سطح زمین با لایه‌ای از آب پوشیده شود. آب ضمن جاری شدن بر روی سطح خاک به درون آن نفوذ می‌کند و خاک را تا عمق مورد نظر خیس می‌نماید.

معایب آبیاری غرقابی یا کرتی

تلفات آب زیاد است
مواد غذایی را از خاک خارج می‌کند
با آب کم نمی‌توان آبیاری کرد
برای همه‌ی گیاهان مناسب نیست
نیاز به تسطیح اولیه دارد.

استپ

یک محیط زندگی تا حدی خشک، پریاد و پوشیده از علف است. تقریباً یک چهارم منطقه خشکی زمین علفزار است. در بسیاری از مناطق، علفزارها جنگل‌ها را از بیابان‌ها جدا می‌کنند. علف‌های باریشه‌های عمیق گیاهان غالباً در یک علفزار هستند. تعداد خیلی کمی درخت و بوته هم در یک علفزار وجود دارد. کمتر از یک درخت در هر جریب (معادل با هزار متر مربع، هر ۱۰ جریب یک هکتار می‌باشد). در سراسر جهان نام‌های متفاوتی برای علفزار وجود دارد مثل: دشت بی درخت، مرتع، استپ و مرغزار.

بارهنج

بارهنج یا بارتنه‌گ که در کتاب‌های طب

جدا شدن از گیاه مادری و کاشته شدن به صورت جدایگانه در گلدان جدید را دارد.

تورب

به توده متراکم قهوه‌ای تا سیاهرنگ از خزه‌ها و گیاهان که بطوط ناقص تجزیه شده‌اند گفته می‌شود. تورب عموماً در زمین‌های بسیار مرطوب و در مناطق معتدل و سردسیر جهان به وجود می‌آید و به عنوان سوخت به کار می‌رود. تورب را می‌توان مرحله نخست تشکیل زغال سنتگ دانست.

تخم مردو

تخم مردو یا برویز گیاهی است که در فصل زمستان و همراه با شروع فصل بارش به صورت دیم (درمنطقه دهکویه لارستان) می‌روید و در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت قابل قابل برداشت می‌باشد.

جزایر قناری

مجموع‌الجزایری است مرکب از هفت جزیره در اقیانوس اطلس، نزدیک به ساحل مراکش و یکی از ۱۷ منطقه خودمختار اسپانیا است. پایتحث آن لاس پالماس است. قناری یا کاناری از ریشه لاتین به معنی سگ است و «گران کاناریا» سگ‌های بزرگ معنی می‌دهد.

خاک‌های لومی

خاک لوم نوعی بافت خاک است که حد واسطه بین شن و رس است. لوم همان خاک خاصلخیز و باخاک گلداری است و به خاک رس و شن که با گیاه پوشیده آمیخته باشد گفته می‌شود.

سنگی قدیم از آن به نام لسان‌الحمل (زبان‌گوسفند) یاد شده است، گیاهی است علفی، چندساله، بدون ساقه، به ارتفاع ۱۰ تا ۷۰ سانتی‌متر با برگ‌های بهن و گسترده و دمبرگ‌های بلند که دارای خواص چشمگیری است

براکته

رایده زیر گل است که غالباً از نظر شکل ظاهری و یارنگ با برگ‌های واقعی فرق دارد براکته‌ها به نام برگه نیز موسوم هستند.

بر جدید

نامی است که به نیم کره غربی یا به طور مشخص قاره آمریکا و برخی جزایر اقیانوس اطلس و آرام و گاهی نیز قاره اقیانوسیه گفته می‌شود. خاستگاه این اصطلاح به پایان سده ۱۵ و بعد از کشف آمریکا توسط کاوشگران اروپایی برمی‌گردد که افق جغرافیایی آدمیان در قرون وسطی را گسترش داد. تا آن زمان تصور می‌شد دنیا فقط به آسیا و اروپا و آفریقا محدود می‌شود که اکنون به همراه یکدیگر به نام بر قدیم شناخته می‌شوند.

به دانه

داخل میوه‌ی «به» دانه‌هایی به رنگ قهوه‌ای یا قهوه‌ای تیره وجود دارد. این دانه‌ها منبع بسیار خوبی از موسیلایز (لعل) هستند و حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد وزن دانه را لعل روی آن تشکیل می‌دهد.

پاجوش

قسمتی از گیاه مادری است که از محل طوفه یا پایین گیاه رشد می‌کند که قابلیت

خاک پیت

به این نوع خاک ها به زبان انگلیسی پیت و به زبان فرانسوی تورب گفته می شود که از تجزیه خزه ها (اسفنگوم) و گیاهان باتلاقی و در شرایط صنعتی از تجزیه به بقایای گیاهان به دست می آید، که بیشتر به خاطر خواص فیزیکی مورد استفاده قرار می گیرد پیت های حاصله با توجه منشا نظر PH و خاصیت جذب آب با هم متفاوت هستند. پیت معمولاً در گلدان به صورت مخلوط با ماسه و خاک برگ و کمپوست مورد استفاده قرار می گیرد.

خوابانیدن

یکی از روش های تولید مثل گیاهان که در آن شاخه گیاه بدون جدا شدن از گیاه مادر ریشه دار می شود

دمبرگ

پایه یک برگ است و برگ را به ساقه وصل می کند

زهکشی

به خارج ساختن آب و نمک های قابل حل از سطح و زیر سطح مزرعه به منظور تسهیل رشد گیاه گفته می شود

سته

میوه هایی هستند از تیره های گوناگون که تمام قسمت بریکاری آن گوشته و محتوی مواد غذایی باشد و هر میوه از یک تخدمان به وجود می آید و دیواره این تخدمان پس از رسیدن، گوشتی است. با این تعریف میوه های متنوعی مانند انگور، سیاه گیله، زغال اخته، بلوبری، خرمالو و خرما را سته به شمار می آورند

سطح ایستایی

به بالاترین تراز آب زیرزمینی بر روی یک سطح مشخص در زیر زمین گفته می شود

سلکسیون

در اینجا به معنای برتر گزینی است

شفت

خم و کج و ناراست و ناهموار

شهرستان استهبان

از شهرستان های استان فارس است

عناب

درختچه ای است متوسط که ارتفاع آن تا ۱۰ متر نیز می رسد. عناب بومی مناطق گرمسیر بوده و برگ های کوچک سبزرنگ، بدون کرک و تخرمگی شکل آن در زمستان می ریزد. میوه زیتونی شکل عناب که دارای خواص دارویی بسیار زیادی می باشد در ابتداء سیز بوده و پس از رسیدن به رنگ قرمز درآمده و چروک می خورد. عناب را «خرمای قرمز» و «خرمای چینی» نیز می نامند

غایابی

بنفس بسیار روشن. بنفس کم رنگ به رنگ گل کاسنی

فونیکس

نام پرنده افسانه ای است که به عربی آن را عنقا و به فارسی آن را ققنوس گویند و در اساطیر مصر، چین، ایران و یونان به کثرت دیده می شود

کاپیتول

نوعی گل آذین مخصوص است که در آن گل ها بدون واسطه‌ی دمگل بر روی نهنج مشترکی قرار دارند مانند کاپیتول گل داودی و بومداران

کمپلکس

پیچیده

گرزن

نوعی گل آذین است که در آن انشعبات جانبی محور اصلی، از رأس آن تجاوز می نماید

گوشوارک

غلاف یا نیام گلبرگ در بعضی از برگ ها گاهی خارج از اندازه رشد کرده، تمامی میانگره ساقه را پوشانده و گاهی ایجاد زایده ای به نام گوشوارک می کند

مراقبه

مدیتیشن وضعیت سکوت مطلق است. آسایش کاملی که در اثر نبودن افکار تولید می شود. حالت هوشیاری کامل؛ تنها در آن هوشیاری است که قادر خواهی بود حقیقت مطلق را ببینی مراقبه روند بسیار ساده ای است. تنها کافی است که کلید درستش را بدانید

مریستم های انتهایی

از مجموعه یاخته های جنینی ساخته شده اند که تکثیرشان سریع است

مضرس

دندانه دار

موسیلاز

موسیلازها گروهی از ترکیبات گیاهی مملو از هستند. (Polysaccharides) پلی‌ساکارید موسیلازها در تماس با آب کم و بیش حل می‌شوند و ماده‌ای لزج، مانند ژلاتین تولید کرده و حجمی می‌شوند

مهمیز

وسیله‌ای برای سوارکاری روی اسب و مرگ است که در انتهای چکمه سوارکاری قرار دارد از فلزات ساخته می‌شود

نشا کاری

یکی از مراحل کشت برنج است. در این مرحله نشا (جوانه برنج) که پیش از این در خزانه آماده شده را به زمین اصلی انتقال می‌دهند. نشا کاری عموماً توسط زنان کشاورز انجام می‌شود

نهنج

تالاموس یا توروس به انتهای شاخه که از قسمت‌های گل نگاهداری می‌کند، گفته می‌شود. نهنج محور یک گل است و قسمت های گل روی آن قرار دارند. چنانچه یک گل به طور جداگانه روی دمگل به وجود آید نهنج انتهای بالابی پایه گل است

واریته

به معنای دسته گوناگون و مجموعه متنوع

هوموس

هوموس یک ماده بیوشیمیایی است که در لایه‌های بالایی خاک که تیره است، تشکیل می‌شود. خود هوموس به رنگ قهوه‌ای تیره تا سیاه است





۶۴





